

## EMPÊCHE L'INTERRUPTION DE LA CROISSANCE LIÉE AUX TRAITEMENTS AVEC HERBICIDES ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES

### AIDE À SURMONTER LE STRESS LIÉ À LA TRANSPLANTATION

### AIDE LES PLANTES ET LES CULTURES À SURMONTER LES CONDITIONS LIÉES AU STRESS

SKICC est la solution nutritionnelle qui offre soutien et protection aux cultures extensives, industrielles et horticoles en conditions de stress. Sa formulation, développée pour activer les défenses naturelles de la plante, préserve l'équilibre cellulaire (homéostasie) grâce à son action au niveau moléculaire. Cela permet la restauration immédiate des actions métaboliques justifiant la récolte des cultures.

SKICC est immédiatement absorbé par la plante (deux heures après l'application) et, grâce à l'absence de chlorures, de sulfates et de carbonates, n'est pas phytotoxique.

Lorsqu'il est appliqué dans des conditions stressantes et à toutes les phases phénologiques, SKICC augmente le niveau de résistance de la culture. SKICC réduit la phytotoxicité lorsqu'il est appliqué en combinaison avec des herbicides et des produits phytosanitaires.

SKICC est la réponse au besoin de limiter les effets négatifs causés par les conditions de stress sur la production de cultures.

CULTURE	MOMENT DE LA DEMANDE	DOSE/HECTARE*
Légumes-fruits (Pastèque, Concombre, Aubergine, Melon, Poivron, Tomate, Courgette, Potiron)	Post-repiquage, pré-floraison, véraison (changement de couleur), en combinaison avec des applications phytosanitaires	4-6 kg
Légumes à feuille (Chicorée, Laitue, Salade rouge, Roquette, Scarole, Céleri, épinard)	Post-repiquage et pendant le développement végétatif en combinaison avec des applications phytosanitaires	4-6 kg
Cultures horticoles diverses (Ail, Brocoli, Chou, Chou-fleur, Oignon, Fenouil, Poireau)	Post-repiquage et pendant le développement végétatif en combinaison avec des applications phytosanitaires	4-6 kg
Tournesol e Maïs	3-6 feuilles en combinaison avec des applications d'herbicides en post-levée	6-8 kg
Cultures céréalières (Blé, Orge, Riz)	Allongement des tiges en combinaison avec un traitement herbicide de post-levée, phase d'amorçage combinée à des applications de fongicides	4-6 kg
Colza	Pré-floraison et nouaison en combinaison avec des applications d'insecticides	4-6 kg
Betterave	Le couvert foliaire se rencontre entre les rangs, en combinaison avec des applications d'herbicides en post-levée	6-8 kg
Canne à sucre	Post-repiquage et pendant le développement végétatif en combinaison avec des applications phytosanitaires	6-8 kg
Soja	Développement végétatif en combinaison avec des applications d'herbicides en post-levée	6-8 kg
Tomate d'industrie	Post-repiquage, pré-floraison, véraison (changement de couleur), en combinaison avec des applications phytosanitaires	4-6 kg
Pomme de terre	Pré-floraison jusqu'à la formation des tubercules en combinaison avec des applications de fongicides	4-6 kg
Coton	Post-levée et pré-floraison en combinaison avec des applications de post-levée/herbicides/fongicides	4-6 kg

COMPOSITION	
Azote (N) total	9%
Azote (N) nitrique	9%
Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) total	6%
Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau	6%
Oxyde de calcium (CaO) Total	10%
Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau	10%
Bore (B) total	0.10%
Bore (B) soluble dans l'eau	0.10%

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	
<b>LIQUIDE</b>	
pH (sol 1%)	7.20
Conductivité E.C. S/cm (1‰)	1150
Densité (g/cm <sup>3</sup> )/Poids spécifique	1.50
<b>MODE D'UTILISATION</b>	
	Fertilisation foliaire

**EMBALLAGE: 6, 25 KG - COMBO PACK**

**NOTE:** L'action de SKICC est renforcée par la combinaison avec le RA.AN L 13186. Un Combo Pack avec les 2 produits ensemble est maintenant disponible.

**AVERTISSEMENTS:** Ne jamais mélanger dans le même bac des engrais contenant du phosphore et/ou des sulfates avec des engrais contenant du calcium. En présence d'eau d'irrigation contenant des niveaux élevés de phosphore, il est nécessaire d'ajouter un acidifiant avant d'utiliser des engrais contenant du calcium. Le produit peut être mélangé avec d'autres produits à l'exception de ceux contenant du cuivre, du soufre, de l'huile minérale et des émulsions.

\*Le choix de la dose est subordonné à divers facteurs et peut être modifié si nécessaire. Toutes les applications peuvent être répétées en fonction des différents besoins des cultures. Vous pouvez contacter notre service technique pour connaître l'application correcte sur sols et conditions climatiques spécifiques.\*]